

Kriterien für die Bewertung des Erhaltungszustandes LRT Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore (7120)			
LR-typische Strukturen	A – hervorragend	B – gut	C- mittel bis schlecht
	Feld 1: Deckung hochwüchsiger Gräser und Kräuter (v. a. Pfeifengras) oder Besenheide [%]		
	< 25	25 - 50	> 50
	Feld 2: Bult- Schlenkenkomplex		
	Bult-Schlenken-Komplex vorhanden	Bult-Schlenken-Komplex fehlt, Entwässerungs-Stadien aus Arten der Hochmoorbulten oder Regenerationsflächen aus Arten der Hochmoorschlenken mit einem Flächenanteil > 50%	Bult-Schlenken-Komplex fehlt, Entwässerungs-Stadien aus Arten der Hochmoorbulten oder Regenerationsflächen aus Arten der Hochmoorschlenken mit einem Flächenanteil < 50 % aber >10%
Vollständigkeit des LR-typischen Arteninventars	Feld 1: Anzahl LR-typischer Arten		
	≥ 11	5 - 10	3 - 4
	Feld 2: Anzahl Bult-Torfmoose / Hochmoor-Charakterarten		
	≥ 5	2 - 4	1
Beeinträchtigungen*	Feld 1: Deckungsgrad Störzeiger [%]		
	0	< 5	5 - 10
	Feld 2: Flächenanteil entwässerter Torfkörper [%]		
	< 25	25 - 50	> 50
	Feld 3: Deckungsgrad Verbuschung mit Gehölzen [%]		
< 10 %	10 - 25 %	> 25-50 %	
*Die Gesamtbewertung der Beeinträchtigungen wird durch die niedrigste Bewertung eines Teilparameters bestimmt			